

Chiusura spontanea di foro maculare miopico.

Nella letteratura mondiale il foro maculare, che può essere di natura traumatica, degenerativo-senile o miopica, ha oltre il 90% di probabilità di peggiorare e causare una perdita irreversibile della funzione visiva centrale. Raramente sono stati riportati nella letteratura internazionale casi di chiusura spontanea di un foro maculare senile o traumatico, ma non sono stati mai riportati casi di chiusura spontanea di un foro maculare miopico, evento considerato impossibile per le particolari caratteristiche dell'occhio affetto da miopia degenerativa.

Il caso in esame riguarda una donna a cui è stata diagnosticata nel 1997 una miopia degenerativa molto elevata (entrambi gli occhi) associata ad astigmatismo. Dopo nove anni (nel 2006) viene riscontrata una gravissima riduzione del visus dell'occhio destro causata da un foro maculare miopico, inequivocabilmente documentato da un esame OCT. Tale situazione di grave ipovisione (cecità parziale) resta invariata per quattro anni, allorché la paziente dichiara un grande miglioramento soggettivo della vista, che viene appurato anche clinicamente e ampiamente documentato dal punto di vista strumentale.

Il buon recupero anatomico e funzionale ottenuto si mantiene a tutt'oggi.